

Основной признак – нарушение поведения, повышенная тревожность, беспокойство при приближении человека, которое проявляется в уходе в дальний угол помещения или в «замирании», иногда угрожающие движения головой, удары ногами в землю, фырканье, «безумные глаза». Статус таких животных в стаде самый низкий, они последние подходят к кормушке или доильному аппарату, поскольку опасаются других животных.

Избыточная чувствительность к прикосновениям, включению света, резким звукам – проявляется в сильных вздрагиваниях, подергиваниях головы, конечностей и всего тела. Привыкание к таким раздражителям отсутствует, в отличие от здоровых животных, которые могут впервые испугаться, но в последующем привыкают.

Не распознавание препятствий. Животные могут останавливаться, пугаться, дрожать или нервничать при пересечении мокрой полосы на асфальте, переступании лопаты, сливного желоба или прохождении открытого дверного проема. Либо отказывается пересекать «мнимое препятствие», либо перепрыгивают через него, высоко поднимая ноги.

Нарушение движений, случайные сокращения или дрожание отдельных групп мышц, движение боком или с широко расставленными конечностями, спотыкание, раскачивания, скольжения при ходьбе. Принимают позу «сидячей собаки».

В терминальной стадии животные лежат, вытянув назад одну или обе конечности.



Эффект губки мозговой ткани

Клиническое проявление ГЭ КРС


1. Общая картина, %



2. Психическое состояние, %



3. Положение тела и движение, %



В ЕВРОПЕ ИЗ-ЗА КОРОВЬЕГО БЕШЕНСТВА БЫЛО УНИЧТОЖЕНО ОКОЛО
4 МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА /КОРОВЬЕ БЕШЕНСТВО/ ГЭ КРС

Медленно развивающаяся инфекционная прионная трансмиссивная болезнь взрослого КРС, характеризующаяся длительным, до 2,5 - 8 летним инкубационным периодом и проявляющаяся поражением центральной нервной системы со 100% летальностью.

Вызывает заболевание скрейпи у овец и болезнь Крейтцфельда-Якоба у людей (при употреблении в пищу мяса, головного и спинного мозга больных животных)

Ранние признаки ГЭ КРС могут выявить владельцы и специалисты, хорошо знакомые с обычным поведением животного: отделение от стада (животное неподвижно стоит у ограждения), вялость, пугливость, преодоление невидимых препятствий. Проявление этих признаков медленно нарастает в течение нескольких недель или месяцев



При подозрении на заболевание взрослого крупного рогатого скота с проявлением признаков, характерных для губкообразной энцефалопатии, а также в случае гибели животных – незамедлительно информировать ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы района (города) или по телефону горячей линии департамента ветеринарии Томской области 88003012440